

# IL CALENDARIO VACCINALE

Piano Nazionale 2017/2019



#IoVaccino

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>ESAVALENTE</b>          | DTPa (difterite-tetano-pertosse) |
|                            | IPV (poliomielite)               |
|                            | Epatite B                        |
|                            | HiB (Haemophilus influenzae B)   |
| <b>PNEUMOCOCCO</b>         | Pneumococco                      |
| <b>ROTAVIRUS</b>           | Rotavirus                        |
| <b>MENINGOCOCCO B</b>      | Meningococco B                   |
| <b>MPR</b>                 | MPR (morbillo-parotite-rosolia)  |
| <b>VARICELLA</b>           | Varicella                        |
| <b>MPRV</b>                | MPRV (MPR+varicella)             |
| <b>MENINGOCOCCO C/ACWY</b> | Meningococco C o ACWY            |
| <b>HPV</b>                 | Papilloma Virus                  |
| <b>INFLUENZA</b>           | Influenza                        |
| <b>HERPES ZOSTER</b>       | Herpes zoster per adulti         |
| <b>EPATITE A</b>           | Epatite A                        |

| 0-30 giorni | 3° mese                          | 4° mese | 5° mese | 6° mese | 7° mese | 11° mese | 13° mese | 15° mese | 6° anno | 12°-18° anno | 19-49 anni                             | 50-64 anni | > 64 anni    | Soggetti a rischio              |
|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|--------------|--|------------|--------------|---------------------------------|
|             |                                  |         |         |         |         |          |          |          |         | dTpaIPV      | 1 dose dTpa ogni 10 anni               |            |              | 3° trimestre di ogni gravidanza |
| *           |                                  |         |         |         |         |          |          |          |         |              |  |            |              |                                 |
|             |                                  |         |         |         |         |          |          |          |         |              |  |            |              | PCV+PPSV                        |
|             | 2 o 3 dosi a seconda del vaccino |         |         |         |         |          |          |          |         |              |  |            |              |                                 |
|             | **                               |         |         |         |         |          |          |          |         |              |  |            |              | Dosi da scheda tecnica          |
|             |                                  |         |         |         |         |          |          | ***      |         |              |  |            |              | 2 dosi a 4 settimane            |
|             |                                  |         |         |         |         |          |          | ***      |         |              |  |            |              | 2 dosi a 4 settimane            |
|             |                                  |         |         |         |         |          |          | ***      |         |              |  |            |              | 2 dosi a 4 settimane            |
|             |                                  |         |         |         |         |          |          | ****     |         |              |  | ACWY       |              | Dosi da scheda tecnica          |
|             |                                  |         |         |         |         |          |          |          |         |              | 2 o 3 dosi a seconda di vaccino ed età |            |              | Dosi da scheda tecnica          |
|             |                                  |         |         |         |         |          |          |          |         |              |  |            | 1 dose annua | Dosi da scheda tecnica          |
|             |                                  |         |         |         |         |          |          |          |         |              | 1 dose dai 50 anni                     |            |              |                                 |
|             |                                  |         |         |         |         |          |          |          |         |              |  |            |              | Dosi da scheda tecnica          |

\* Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle Ig, la 1° dose di vaccino e completare il ciclo (dalla 3° dose seguire il calendario).

\*\* Il numero di dosi dipende dall'età di inizio. Oltre i 24 mesi ne bastano due.

\*\*\* MPR+V oppure MPRV

\*\*\*\* Dose singola di Men C o ACWY. Nei soggetti a rischio si può iniziare dal 3° mese con 3 dosi, di cui l'ultima dopo l'anno.